



**Informationen (Direct Healthcare Professional Communication)
zu Patienten, die mit ARCOXIA® (Etoricoxib) behandelt werden**

die Fachkreise waren bereits früher über das mit der Einnahme von Etoricoxib verbundene Risiko von unerwünschten hypertensiven Ereignissen informiert worden. Das gilt auch für die Kontraindikation für die Anwendung von Etoricoxib bei Patienten mit Hypertonie, deren Blutdruck nicht adäquat eingestellt ist.

Analysen aus einer Anwendungsdatenbank (General Practice Research Database) in Großbritannien zeigen, dass eine beträchtliche Anzahl von Patienten mit einem systolischen Blutdruck >150 mmHg und/oder einem diastolischen Blutdruck >90 mmHg entgegen den bisherigen Empfehlungen auf Etoricoxib eingestellt wurde.

Bitte achten Sie bei der Verordnung von Etoricoxib auf folgende Punkte:

- ▶ Bei Patienten mit Hypertonie, deren Blutdruck anhaltend über 140/90 mmHg erhöht und nicht ausreichend eingestellt ist, darf Etoricoxib nicht angewendet werden.
- ▶ Bei allen Patienten sollte der Blutdruck in den ersten zwei Wochen nach Behandlungsbeginn und danach in regelmäßigen Abständen überwacht werden.

Kontaktadresse für weitere Informationen: Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Schreiben oder zur Anwendung von ARCOXIA® haben, wenden Sie sich bitte an unser medizinisches Infocenter unter 0800 673 58 38.

Mit freundlichen Grüßen,
MSD SHARP & DOHME GMBH


Dr. Thomas Lang
Medizinischer Direktor


Dr. Eberhard Zeiner
Direktor Medical Services

Anlage
Fachinformation